

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70

DLP-2-6-33031740



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 148  
du 25 Mai 1989

\* Réabonnez vous avec  
la feuille jointe \*

\* Réabonnez vous avec  
la feuille jointe \*

### \* OLIVIERS \*

C'est le moment d'intervenir contre la teigne dans les vergers atteints. Utilisez de préférence

bacillus thuringiensis  
ou carbaryl  
dimethoate

BACTOSPEINE  
SEVIN  
N.S.

### \* ARBRES FRUITIERS

#### \*\* Acariens sur arbres fruitiers (rappel)

Ils pullulent. Réalisez un traitement comme conseillé dans notre dernier bulletin.

#### \*\* Mouche de la cerise

Intervenez dès maintenant avec un produit larvicide. Attention aux délais avant récolte

| <u>Délai avant récolte</u> | <u>Matière active</u> | <u>g.M.A/hl</u> | <u>Spécialités commerciales</u> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 7 jours                    | diméthoate            | 30              | nombreuses spécialités          |
| 7 jours                    | formothion            | 50              | ANTHIO-FORT                     |
| 7 jours                    | malathion             | 100             | MALIXOL L50, ZITHIOL            |
| 15 jours                   | diazinon              | 30              | BASUDINE                        |
| 15 jours                   | fenthion              | 50              | LEBAYCID                        |

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA  
Directeur - Gérant : J.C. COQUET

Abonnement Annuel :  
à  
Régisseur de Recettes

Publication Périodique  
CPPAP N° 1769 - AD

ISSN  
C7 39 - 9633

P65

**\*\* Tordeuse orientale du pêcher** : Maintenez la protection sur les jeunes vergers. Des dégâts sont visibles aux extrémités de pousses. Préférez des spécialités à base de fenitrothion (Nombreuses spécialités).

**\*\* Cochenilles du mûrier sur pêcher** : De nombreuses larves sont visibles. Traitez dès maintenant avec du methidation (ULTRACTOL) ou parathion (N.S.)

## AGRUMES

**\*\* Pucerons verts et noirs** : Ils sont nombreux aux extrémités des jeunes pousses, mais seuls les arbres dont les jeunes pousses sont très envahies doivent être traités. Préférez le pyrimicarbe (PIRIMOR)

**\*\* Aleurodes ou mouches blanches** : Les vols sont abondants mais ne traitez pas pour le moment. Attendre la fin de vol des adultes. Un prochain bulletin fera le point.

## VIGNE

**\*\* Mildiou** : De rares taches sont visibles. Les conditions climatiques actuelles sont tout à fait défavorables au développement du mildiou. Ne traitez pas inutilement. Par contre, la floraison est une période pendant laquelle la vigne doit être absolument protégée. Effectuez votre traitement au fur et à mesure que les différents cépages vont atteindre la floraison. Préférez un produit systémique ou pénétrant.

**\*\* Oïdium** : Prévoyez un soufrage en pleine floraison

**\*\* Cicadelles vertes** : sont quelquefois abondantes, mais dans toutes les parcelles observées le seuil de une cicadelle par feuille n'a jamais été atteint.

**\*\* Cochenilles farineuses de la vigne** : Les toutes premières jeunes larves sont visibles. Repérez les parcelles où les pieds sont noircis et où les fourmis pullulent. Attendez pour traiter.

**\*\* Tordeuses de la grappe** : Le vol de première génération est terminé. Il est resté faible dans les régions d'AJACCIO, SARTENE, CALVI, PATRIMONIO de même qu'en CASINCA. Dans les régions d'ALERIA, PIANICCIA, GHISONACCIA, où les vols furent plus importants, différents contrôles ont été réalisés. Le seuil de 200 glomérules pour 100 grappes n'a pas été observé. Il est donc inutile de traiter.

**\*\* Cicadelles de la flavescence dorée** : Elles ont été observées en début de semaine dans des parcelles à AJACCIO et SARTENE. Ne traitez pas pour le moment.